

Eklomax

Concime organico azotato
BIOATTIVATORE

P L U S

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



SCOPRI COS'È
EKLOMAX PLUS



DISTRIBUITO IN ITALIA DA:


bioagrimar

C.so Garibaldi 86 - 70010 Casamassima (BA)

InfoTel +39 342.942.81.12

Iscrizione n. 01952/17

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto **EKLOMAX PLUS** è un prodotto esclusivamente per uso agricolo e può essere applicato radicale o foliare. È vietato ogni uso improprio e diverso dalla buona pratica agricola.

MISCIBILITÀ: Non utilizzare insieme a rame o zolfo. Eseguire saggi di compatibilità nel caso di miscelazione con altri prodotti.

CONSERVAZIONE: Conservare il prodotto ben chiuso ad una temperatura compresa tra i 4 °C e i 30 °C, evitare di congelarlo. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Utilizzare nelle ore più fresche della giornata

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

CARATTERISTICHE FISICHE

AMINOACIDI	2000 mg/kg
POLYAMINES	< 40 mg/kg
PLANT HORMONE	
FREE INDOLE 3 ACETIC ACID	> 2500 µg/kg

SALICYLIC ACID	> 13000 µg/kg
JASMONIC ACID	3,8 µg/kg
ABSCISIC ACID	13,7 µg/kg
POLYAMINES	16,1 µg/kg

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune con ferro (Fe) e zinco (Zn)

Azoto (N) organico	1%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
pH	4,7
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	30%
Ferro (Fe) solubile in acqua	1%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	1%
Zinco (Zn) totale	1%

H 412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

AGENTE CHELANTE: EDTA

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9.

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie.

Materie prime: estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina chelato di ferro (EDTA), ossido di zinco.

DOSAGGIO

Cultura	Dosaggio (ml/ettaro)	Applicazioni (nr. stagione)
ORTAGGI	800 / 1000	2 - 4
Epocche: Dopo 15 gg trapianto		
FRUTTIFERI	800 / 1200	2 - 6
Epocche: Dall'apertura delle gemme ad intervalli di 15 gg a seconda della varietà		
UVA DA TAVOLA	800 / 1200	Diverse
Epocche: Da apertura gemme a preforitura, da post allegazione ad intervalli di 10/12 gg fino a prematurazione		
OLIVO	1000 / 1200	3 - 3
Epocche: Dalla preforitura a post allegazione ad intervalli di 15 gg		
FERTIRRIGAZIONE	3 - 4 lt/ha	2 - 3
Epocche: Nella varie fasi della coltura ogni 15 gg.		

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

Lotto - Data di scadenza

PRODOTTO IN SUD AFRICA

PESO NETTO 5 kg